

# **Brote de Fiebre Amarilla**

# SÍNTOMAS DE ALERTA

## ¡ATENCIÓN A ESTAS SEÑALES!

**LA ENFERMEDAD TIENE FASES:**

**Inicial:** Fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares ( parecido al dengue).

**Remisión:** Breve mejoría de 24 horas.

**Grave (Toxémica):** Vuelve la fiebre, aparece la ictericia (piel/ojos amarillos), orina oscura y posibles hemorragias.

**Letalidad:** Hasta el 50% de los casos graves pueden ser fatales.




# ¿CÓMO SE TRANSMITE? NO ES DE PERSONA A PERSONA

Se transmite por la picadura de  
**mosquitos** (*Aedes aegypti* en ciudades y  
*Haemagogus/Sabethes* en zonas selváticas).



# La Situación **ACTUAL** ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



La **OPS** ha clasificado el **riesgo** en **Sudamérica** como **"Alto"** debido al aumento de casos y mortalidad.

En **Venezuela** se ha detectado un **brote reciente** con **36 casos confirmados** y presencia del virus en **14 estados**.

Se han identificado **síntomas en humanos y muertes en monos (epizootias)** en diversas regiones.



# ¿Dónde está el riesgo?

(estados prioritarios)



## Zonas de mayor vigilancia



El Gobierno ha iniciado una **jornada especial** en **22 parroquias** de estos **4 estados clave**:

- 📍 Aragua
- 📍 Lara
- 📍 Barinas
- 📍 Portuguesa

**Nota:** Si vives en estas zonas o vas a viajar a ellas, la vacunación es urgente.

